



## ZINC WOLF TRAX DDP RECOMENDACIONES PARA DIFERENTES DOSIS DE APLICACIÓN

La tecnología de recubrimiento para fertilizante de Wolf Trax DDP, le permite hacer aplicaciones de micronutrientes mas temprano que las aplicaciones foliares. Una combinación de aplicaciones al suelo y al follaje de Zinc DDP es la formas mas eficiente de asegurar un adecuado suministro a través de las etapas de crecimiento, en áreas donde se muestran deficiencias moderadas a severas.

La siguiente tabla le puede ayudar a seleccionar la apropiada dosis de aplicación de Wolf Trax DDP. Para seleccionar una dosis precisa dentro de cada rango mas apropiado para las condiciones locales, de su cultivo, favor de consultar a su distribuidor o representante de Wolf Trax.

	DOSIS PARA DIFERENTES CATEGORIAS		
	DOSIS DE MANTENIMIENTO +	DOSIS PARA DEFICIENCIA MODERADA ++	DOSIS PARA DEFICIENCIA SEVERA +++
<b>Zn</b>	Dosis recomendada para aquellos productores que prefieren usualmente mantener niveles de Zinc año con año, debido a la remoción de nutrientes por el cultivo.	Recomendar estas dosis cuando "hambre oculta" es una preocupación o cuando el análisis de suelo hace referencia a los niveles de Zinc como "marginal".	Recomendar esta dosis cuando los síntomas son altamente visible ya sea en todo el campo o en áreas localizadas, o cuando los niveles de Zinc en el análisis de suelo indica "deficiente".
<b>Indicadores en análisis de suelo</b>	Cuando el análisis de suelo indica menor a 0.7 ppm DTPA-Zinc extraible.	Cuando el análisis de suelo indica de 0.5 a 0.7 ppm DTPA Zinc extraible.	Cuando el análisis de suelo indica menor a 0.5 ppm DTPA Zinc extraible.
<b>Recomendaciones de Wolf Trax Zinc DDP mezclando con fertilizantes granulados para su recubrimiento.</b>	Aplicar de 400 gr/ha a 500 gr/ha de Zinc DDP como recubrimiento en mezclas NPK.	Aplicar de 500 gr/ha a 2 Kg/ha de Zinc DDP como recubrimiento en mezclas de NPK y considerar 1 aplicación foliar subsecuente de Zinc en cantidades suficientes si es requerido.	Aplicar 500 gr/ha a 2 Kg/ha de Zinc DDP como recubrimiento en mezclas NPK. Aplicación foliar subsecuente de Zinc en cantidades suficientes como sea requerido.



Matriz : Km. 14.5 Carretera a San Luis R.C.  
Delegación González Ortega / Mexicali, B.C. 21397  
Tel. (686) 561-0478 Fax (686) 561 1102